

Minoxidil, lotion 2 g/100 ml

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Minoxidil, lotion 2 g/100 ml en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Minoxidil, lotion 2 g/100 ml en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof van Minoxidil, lotion 2 g/100 ml, minoxidil, stimuleert bij plaatselijk gebruik enigermate de haargroei bij sommige mannen met kaalheid. De haargroei stimulatie wordt waargenomen na circa 4 of meer maanden toepassing en is verschillend van patiënt tot patiënt. Na 4 maanden wordt bij slechts een gering percentage van de patiënten enig effect waargenomen, terwijl bij minstens 2/3 van de patiënten geen effect wordt gezien. Na 12 maanden is bij ongeveer 1/3 van de patiënten sprake van enige haargroei. Bij staken van minoxidil lotion stopt de nieuwe haargroei en keert het beeld van voor de behandeling binnen 3 à 4 maanden terug. Wanneer men na 1 jaar geen resultaat heeft gezien dient men het gebruik van minoxidil lotion te staken.

Minoxidil lotion 2 g/100 ml wordt toegepast bij de behandeling van het kaalwordingsproces bij mannen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

De mogelijkheid bestaat dat een kleine hoeveelheid minoxidil wordt opgenomen via de huid. Er kunnen dan verschijnselen optreden zoals hartkloppingen, pijn op de borst, vochtophopingen in het lichaam of duizeligheid bij plotseling rechtop gaan staan uit zittende of liggende houding.

De mogelijkheid bestaat dat het dragen van een pruik de hoeveelheid minoxidil die door de huid wordt opgenomen verhoogd.

Indien u last krijgt van de bovengenoemde bijverschijnselen, moet onmiddellijk worden gestopt met het aanbrengen van de lotion en uw arts worden geraadpleegd.

Minoxidil lotion kan branderigheid en irritatie van de ogen veroorzaken als de lotion in contact komt met de ogen. In dit geval, en ook als de lotion op andere gevoelige plaatsen komt zoals de geschaafde huid of slijmvliezen, direct spoelen met koud leidingwater.

Gebruik van minoxidil lotion bij patiënten met een bestaande huidaandoening wordt afgeraden, aangezien het effect van minoxidil bij deze groep patiënten niet bekend is. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Ouderen

Minoxidil lotion is niet geschikt voor gebruik bij patiënten ouder dan 65 jaar aangezien veiligheid en werkzaamheid van minoxidil lotion bij deze groep patiënten niet is onderzocht.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Minoxidil lotion is niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar aangezien veiligheid en werkzaamheid van minoxidil lotion bij deze groep patiënten niet is onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Minoxidil, lotion 2 g/100 ml nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Op dit moment zijn geen wisselwerkingen van minoxidil lotion met andere geneesmiddelen bekend.

Aangeraden wordt om tijdens gebruik van minoxidil lotion niet gelijktijdig op de te behandelen hoofdhuid andere uitwendige producten te gebruiken (zalven, crèmes, lotions).

Zwangerschap en borstvoeding

Minoxidil lotion is niet bestemd voor gebruik bij vrouwen. Over het gebruik van minoxidil in de zwangerschap bij de mens bestaan overigens onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Minoxidil lotion mag dus niet worden gebruikt in de zwangerschap.

Door de huid opgenomen minoxidil komt in de moedermelk. Vrouwen die borstvoeding geven dienen dus in geen geval minoxidil lotion te gebruiken!

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van minoxidil lotion op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient echter rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid, zwakte en stoornissen in het gezichtsvermogen, welke bijwerkingen zich soms kunnen voordoen.

Minoxidil lotion bevat propyleenglycol, ethanol, bergamotolie en benzoaatzuur

Dit middel bevat:

- 100 mg propyleenglycol per puf.
- 800 mg ethanol (alcohol) per puf.
- 0,0055 mg benzoaatzout per puf.
- bergamotolie.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 1 puf minoxidil lotion (ongeveer 20 mg minoxidil) tweemaal per dag, om de 12 uur, op het midden van de kalende hoofdhuid aanbrengen en over de gehele plek verdelen. De totale dagdosis bedraagt maximaal 2 pufs.

De lotion mag uitsluitend op de hoofdhuid worden aangebracht. Het aanbrengen op de hoofdhuid geschiedt met behulp van de doseerpomp of de flacon. Voor het toedienen van een puf moet de doseerpomp geheel worden ingedrukt.

Zorg ervoor dat de hoofdhuid en het haar volkomen droog zijn. Gebruik geen haardroger na het aanbrengen van de lotion. Was na het aanbrengen van de lotion zorgvuldig de handen.

